

PATIËNTINFORMATIEFOLDER

Lees deze patiëntinformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit middel. Bewaar deze patiëntinformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker. Dit middel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit middel niet door aan anderen.

Chloorhexidinedigluconaatmondspoeling 0,2% Livsane (200 ml)

Samenstelling

2 mg Chloorhexidinedigluconaat per ml
Sorbitol, Gezuiverd water, Alcohol, Chloorhexidinedigluconaat, Pepermuntolie.

Werking en/of toepassing

De werkzame stof in Chloorhexidinedigluconaatmondspoeling is chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat doodt vele soorten bacteriën die in de mondholte voorkomen en ontstekingen of tandbederf kunnen veroorzaken. Het wordt gebruikt bij infecties in de mond of om dergelijke infecties te voorkomen.

Bij een infectie in de mond is er sprake van een ontsteking van het mondslijmvlies, de tong, het gebit of het tandvlees. Meestal is er sprake van een ontsteking van het tandvlees.

Bij een mondinfectie heeft u pijn in de mond, aan de tong, het gebit of het tandvlees. Het ontstoken gedeelte is rood en gezwollen. Soms bloedt het. Een mondinfectie kan een slechte adem veroorzaken.

Ook tandplak ontstaat door inwerking van bacteriën. Tandplak bestaat uit een opeenhoping van bacteriën en suikers op het oppervlak van de tanden. Door tandplak kunnen gaatjes ontstaan, daarom moet het dagelijks door poetsen of flossen worden verwijderd.

Gebruikelijke doseringen

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Spoel tweemaal per dag de mondholte gedurende 1 minuut met 10 milliliter en spuug dat vervolgens uit. Eventueel kan worden gespoeld met een mengsel van 5 milliliter mondspoeling en 5 milliliter leidingwater dat u direct voor gebruik heeft gemengd. Slik het niet door. Draagt u een kunstgebit, neem dit dan uit voordat u de mond spoelt. Het kunstgebit moet u reinigen en vervolgens een kwartier in de spoelvloeistof leggen.

Gebruik dit middel vlak na het tandenpoetsen, of zorg ervoor dat u na gebruik van dit middel een halfuur lang uw tanden niet poetst. De stoffen uit de tandpasta kunnen chloorhexidinedigluconaat onwerkzaam maken.

Wanneer begint de werking?

De werking begint direct en houdt aan zolang het middel in de mond is.

Hoe lang kan ik dit middel gebruiken?

Na tandheelkundige ingrepen krijgt u dit middel meestal voor 1 tot 2 weken. Bij ontsteking van het tandvlees kan de behandeling tot een maand duren. Bij beugels ('slotjes') en dergelijke kan het gebruikt worden zolang het tandenpoetsen moeilijk gaat. Overleg hierover met de orthodontist.

Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken, of als u behalve keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn plaatselijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

LIVSANE

- Tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen geelbruin tot zwartbruin verkleuren. De kleur verdwijnt meestal vanzelf wanneer u geen chloorhexidinedigluconaat meer gebruikt. Zo niet, dan kan de tandarts de verkleuring verhelpen. De verkleuring is sterker als u vlak voor het gebruik van chloorhexidinedigluconaat thee, koffie of rode wijn heeft gedronken. U kunt deze verkleuring tegengaan door na thee, koffie of rode wijn uw tanden te poetsen voordat u chloorhexidinedigluconaat gebruikt.

Zelden

- Branderig aanvoelende tong.
- Droog mondslijmvlies.
- Veranderingen van smaak, dit gaat vanzelf over als u dit middel niet meer gebruikt.

Raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

De mondspoeling is niet geschikt voor kleine kinderen, zij hebben de neiging het door te slikken. Berg het zo op dat zij er niet bij kunnen.

Gebruik met andere (genees)middelen

Normale tandpasta maakt dit middel onwerkzaam. Poets daarom altijd of vlak voor het gebruik van chloorhexidinedigluconaat of minimaal een half uur erna. Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Let op met Chloorhexidinedigluconaat mondspoeling

Vermijd elk contact van Chloorhexidinedigluconaat mondspoeling met de ogen. Als de oplossing toch in contact komt met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.

Wanneer niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken, wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op chloorhexidinedigluconaat en/of op één van de andere bestanddelen.

Gebruik bij zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruik bij borstvoeding

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Toedieningsvorm

Mondspoeling

Kleur

Heldere oplossing

Bewaren

Beneden 25°C bewaren, niet in de koelkast of vriezer.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Sluit de fles na gebruik goed af.

Na openen 6 maanden houdbaar.

Uiterste gebruiksdatum en chargennummer: zie etiket.

Verkrijgbaarheid

Dit middel is zonder recept exclusief bij de apotheek te verkrijgen.