

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE
GEBRUIKER

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit
geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.
Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem
later weer nodig.
- *Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
uw apotheker.*
- *Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of
wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.*
- *Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in
rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.*

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1. Wat is Livsane Koortslipcrème Aciclovir
50 mg/g en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of
moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS LIVSANE KOORTSLIPCRÈME
ACICLOVIR 50 MG/G EN WAARVOOR
WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g crème
bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen
en gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen
in de huid tegen.

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g crème
wordt gebruikt voor de behandeling van een
koortslip veroorzaakt door een herpesvirus.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Wanneer u allergisch bent voor de werkzame
stof aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol
of voor een van de andere stoffen in dit
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit
middel?

- Bij het aanbrengen van de crème. Vermijd elk
contact met de slijmvliezen, zoals de mond, het
oog of de vagina, omdat hierdoor irritatie zou
kunnen optreden.
- Ongewilde toediening in het oog dient te
worden voorkomen.
- *Indien u een ernstig verminderde werking van
het afweersysteem heeft (bijvoorbeeld indien u
AIDS patiënt bent of wanneer u een ontvanger
bent van een beenmergtransplantaat). Het is
mogelijk dat u behandeld moet worden met
Aciclovir tabletten. Raadpleeg uw arts over de
behandeling van elke infectie.*
- De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties
veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan
lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis)
veroorzaken.

*Neem contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit middel gebruikt.*

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen wisselwerkingen met andere
geneesmiddelen bekend.

*Gebruikt u naast Livsane Koortslipcrème Aciclovir
50 mg/g crème nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.*

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij het gebruik van dit middel tijdens de
zwangerschap zijn er geen schadelijke effecten
te verwachten op de gezondheid van u of van uw
ongeboren kind.

Borstvoeding

*Indien u borstvoeding geeft, mag u dit middel
slechts gebruiken na overleg met de arts.
De werkzame stof wordt in de moedermelk
uitgescheiden. Echter de hoeveelheid die baby's
hierdoor kunnen binnenkrijgen is verwaarloosbaar.*

In verband met het risico van besmetting van
de baby dient u bij het geven van borstvoeding
tijdens een koortslipaanval extra op te letten.
Omdat het afweermechanisme van baby's nog
niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties
bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg
belangrijk om vooraf uw handen te wassen en
een mondmasker te dragen tijdens het voeden
en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en
familieleden gelden dezelfde regels.

*Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u
zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u
dit geneesmiddel gebruikt.*

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft dit middel geen effect
op de rijvaardigheid of op het vermogen om
machines te gebruiken.

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g
crème bevat propyleenglycol

*Dit middel bevat 150 mg propyleenglycol per
gram crème. Propyleenglycol kan huidirritatie
veroorzaken. Gebruik dit middel niet bij
pasgeborenen jonger dan 4 weken met open
wonden of grote beschadigde huidoppervlakken
(zoals brandwonden) zonder eerst met uw arts of
apotheker te overleggen.*

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g
crème bevat cetylalcohol

Cetylalcohol kan plaatselijke huidreacties
veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk
worden, juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken,
zijn dit voortekenen van koortslipblaasjes. Indien
u regelmatig last heeft van koortslipblaasjes
herkent u deze tekenen en kunt u de aanval
voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk
op deze blaasjes Aciclovir crème aan volgens het
voorschrift. De behandeling kan echter ook in een
latere fase worden gestart.

*Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals
beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.*

Dosering

Volwassenen en kinderen
Breng de crème vijf keer per dag aan met
tussenpozen van ongeveer 4 uur. 's Nachts hoeft
u geen crème aan te brengen.
*Begin zo snel mogelijk bij het begin van de
koortslip met de behandeling. Zet de behandeling
minstens 4 dagen voort. Wanneer de genezing
na tien dagen, gerekend vanaf het begin van de
behandeling, niet volledig is wordt u geadviseerd
een arts te raadplegen.*

Wijze van gebruik

- Breng Aciclovir crème aan door een beetje
crème op uw vingertop te knijpen en dit
vervolgens op de aangedane delen aan te
brengen. De aangedane delen zijn die delen,
ook van de lippen, waar de infectie actief is,
dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn
verschenen.
- Om de overdracht van het virus op andere
delen van het lichaam (bijv. de ogen) of
op andere personen (bijv. door kussen) te
voorkomen is het van belang om aanraken van
de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw
handen te wassen nadat u de blaasjes heeft
aangeraakt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van dit middel gebruikt heeft, zal u
waarschijnlijk geen last krijgen van ongewenste
effecten.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng dit middel alsnog aan en ga verder met de
behandeling zoals hierboven aangegeven.





Als u stopt met het gebruik van dit middel

U kunt het gebruik van dit middel stopzetten zonder nadelige gevolgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ene bijwerking komt vaker voor dan de andere.

Daarom zijn de onderstaande bijwerkingen verdeeld in de volgende categorieën:

Ze	er vaak	komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak:		komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
Soms:		komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers
Zelden:		komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers
Ze	er zelden:	komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms

- Licht branderig of stekend gevoel op de plaats van aanbrengen
- Een milde vorm van droge huid of schilfering
- Jeuk

Zelden

- Roodheid van de huid
- Ontsteking van de huid door overgevoeligheid voor aciclovir of één van de overige bestanddelen van de crème

Immuunsysteemaandoeningen

Ze

- *Overgevoeligheidsreactie inclusief angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie). Indien ademhalingsmoeilijkheden optreden, staak dan het gebruik van Aciclovir crème en neem onmiddellijk contact op met uw arts.*
- Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de tube na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na het openen van de tube is dit middel 12 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is aciclovir. Eén gram crème bevat 50 mg aciclovir.
- De andere stoffen in dit middel zijn: PEG-5-glycerolstearaat, dimethicon, cetylalcohol, vloeibare paraffine, vaseline, propyleenglycol (E1520), gezuiverd water.

Hoe ziet Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g is een geneesmiddel in de vorm van een witte tot gebroken witte crème.

Livsane Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g wordt geleverd in een aluminium tube met polyethyleen dop. De tubes bevatten 2 of 3 gram crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Brocacef Supplies & Services B.V.
Straatweg 2
3604 BB Maarssen
Nederland

Fabrikant

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 105494 Livsane Koortslipcrème
Aciclovir 50 mg/g, crème

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021.